

Sarampión

**NO ES
SIMPLEMENTE
UN SARPULLIDO
LEVE**



El sarampión puede ser peligroso, sobre todo en los bebés y niños pequeños.



LOS SÍNTOMAS DE SARAMPIÓN INCLUYEN POR LO GENERAL LOS SIGUIENTES:

- Fiebre alta (puede subir hasta más de 104° F)
- Tos
- Moqueo
- Ojos enrojecidos y llor
- Sarpullido que aparece 3 a 5 días después de que empiezan los síntomas



El sarampión puede ser grave



Cerca de 1 de cada 4 personas que contraen el sarampión será hospitalizada



1 de cada 1000 personas con sarampión presentará inflamación del cerebro por la infección (encefalitis), lo cual puede causar dano cerebral.



1 o 2 de cada 1000 personas con sarampión morirán, aun cuando reciban la mejor atención.



Usted tiene el poder de proteger a su hijo.

Dele a su hijo una protección **segura y duradera** contra el sarampión al asegurarse de que reciba **la vacuna contra el sarampión, las papera y la rubeola (MMR)**, según el calendario de vacunación recomendado por los CDC.

WWW.CDC.GOV/MEASLES



American Academy
of Pediatrics



DEDICATED TO THE HEALTH OF ALL CHILDREN™



AMERICAN ACADEMY OF
FAMILY PHYSICIANS

STRONG MEDICINE FOR AMERICA